



INTERNATIONAL SOCIETY of NEUROBIOLOGY
& PSYCHOPHARMACOLOGY

7^η Επιστημονική Εκδήλωση Ψυχιατρική στην Καθημερινή Κλινική πράξη

με θέμα: “Μείζονα καταθλιπτική διαταραχή”

14-16 Μαρτίου 2014

Ξενοδοχείο Limneon,
Καστοριά

<http://www.psychiatry.gr>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ





Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην **7η Επιστημονική Εκδήλωση, Ψυχιατρική στην Καθημερινή Κλινική Πράξη** με θέμα: "**Μείζονα καταθλιπτική διαταραχή**", η οποία θα διεξαχθεί από τις 14 έως και 16 Μαρτίου 2014 στο Ξενοδοχείο Limneon, στην Καστοριά.

Η Επιστημονική Εκδήλωση διοργανώνεται από την International Society on Neurobiology and Psychopharmacology και έχει σαν στόχο να προωθήσει το γεφύρωμα της απόστασης μεταξύ της ψυχιατρικής έρευνας και της καθημερινής μαχόμενης κλινικής πράξης.

Το γεφύρωμα του χάσματος αυτού αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη πρόκληση καθώς είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ένα διεθνώς μεγάλο πρόβλημα που αφορά τόσο τη συνεχιζόμενη (ψυχ)ιατρική εκπαίδευση όσο και τη βελτίωση της ποιότητας της ίδιας της έρευνας. Αλλά κυρίως στο να επιτευχθεί μια τόσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με σεβασμό των αναγκών τόσο των ασθενών και των οικογενειών τους όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο δύσκολο και απαιτητικό, ιδιαίτερα με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την ανάγκη καθιέρωσης δεικτών ποιοτικού και οικονομικού ελέγχου.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε προσβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή σας για ένα γόνιμο διάλογο.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης

Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ




Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

09:00-10:00	Χαιρετισμοί-Έναρξη
10:00-11:00	Ομιλία Συνοσπρότητα κατάθλιψης με οργανικές βλάβες του ΚΝΣ Π. Φωτιάδης
11:00-12:00	Ομιλία Αναπηρία και συνολική επιβάρυνση από την κατάθλιψη Σ. Μαγειρία
12:00-13:00	Ομιλία Βασικές αρχές φαρμακοθεραπείας στις διαταραχές της διάθεσης Ι. Παυλίδης
13:00-14:00	Ομιλία Γνωστική-Συμπεριφορική θεραπεία της κατάθλιψης Σ. Μωυσίδου
14:00-17:00	Μεσημβρινή Διακοπή
17:00-18:00	Ομιλία Ψυχοεκπαίδευση στη διπολική διαταραχή Σ. Μωυσίδου
18:00-19:00	Ομιλία Η αντιμετώπιση των διαταραχών της διάθεσης στο ιδιωτικό ιατρείο σε εποχές οικονομικής κρίσης Ι. Παυλίδης
19:00-20:00	Ομιλία Μονοπολικότητα έναντι διπολικότητας. Πού βρίσκεται το όριο? Σ. Μαγειρία
20:00-21:00	Ομιλία Δέκα χρόνια μετά-αναλύσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των αντικαταθλιπτικών. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Κ. Ν. Φουντουλάκης
21:00	Δείπνο

Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

09:00-10:00	Ομιλία Θεραπευτικές οδηγίες στη μείζονα κατάθλιψη Φ. Κουινιάκης
10:00-11:00	Ομιλία Μονής έναντι διπλής δράσης αντικαταθλιπτικά Π. Φωτιάδης
11:00-12:00	Ομιλία Ψυχωτικά συμπτώματα στην κατάθλιψη Β. Μποζίκας
12:00-13:00	Ομιλία Η θεραπεία της κατάθλιψης στο σύγχρονο οικονομικό-πολιτικό περιβάλλον Κ. Ν. Φουντουλακης
13:00-14:00	Ομιλία Ο ρόλος των διαταραχών προσωπικότητας στην αιτιοπαθογένεια των διαταραχών της διάθεσης Σ. Μαγειρία
14:00-18:00	Μεσημβρινή Διακοπή-Γεύμα
18:00-19:00	Ομιλία Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην κατάθλιψη Φ. Κουινιάκης
19:00-20:00	Ομιλία Διπολική έναντι μονοπολικής κατάθλιψης Κ. Ν. Φουντουλάκης
20:00-21:00	Δορυφορική Διάλεξη Αρκεί η ανακούφιση των ασθενών από τα συμπτώματα της κατάθλιψης; Η σημασία της λειτουργικής αποκατάστασης Β. Μποζίκας
21:00	Δείπνο

με την ευγενική χορηγία της 

Κουνιάκης Φίλιππος

Ψυχίατρος, Επιστ. Συνεργάτης Γ΄ Πανεπιστημιακής
Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Μαγειρία Σταματία

Ψυχίατρος, Επιστ. Συνεργάτης Γ΄ Πανεπιστημιακής
Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Μποζίκας Βασίλειος

Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής,
Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μωυσίδου Στεφάνια

Ψυχολόγος, Θεσσαλονίκη

Παυλίδης Ιωάννης

Ψυχίατρος, Θεσσαλονίκη

Φουντουλάκης Ν. Κωνσταντίνος

Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Γ΄ Πανεπιστημιακή
Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Φωτιάδης Πέτρος

Ψυχίατρος, Επιμελητής Ψυχιατρικής Κλινικής,
424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη



Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής

14-16 Μαρτίου 2014

Καστοριά Ξενοδοχείο Limneon

Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες της Επιστημονικής Εκδήλωσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Γραμματεία διοργάνωσης επιστημονικής εκδήλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Επιστημονικής Εκδήλωσης.



GLOBAL EVENTS

Θεσσαλονίκη: Σταδίου 50Α, 555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734 • Fax: 2310 247746 • E-mail: info@globalevents.gr

Αθήνα: Παλαιολόγου Μπενιζέλου 6, 10 556 Πλάκα, Αθήνα

Τηλ.: 210 3250260 • Fax: 210 3259999 • E-mail: athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr



Ακόμη κι αν είναι δύσκολη η πλήρης ύφεση της κατάθλιψης, μπορείτε **ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ** **ΝΑ ΤΗΝ ΠΕΤΥΧΟΥΝ.**

Οδηγήστε τους ασθενείς σας έξω από τον λαβύρινθο της κατάθλιψης με Cymbalta®.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CYMBALTA®

Δραστηριότητα: υδροχλωρική ντολοξετίνη. **Φαρμακευτικές ενδείξεις:** μόνιμη καταθλιπτική διαταραχή, διηθητικό περιφερικό νευροπαθητικό άλγος, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή (ΓΑΔ), Δυσουλολία και πρόπας χορήγησης: Πα λεπτομερείς οδηγίες δοσολογίας, συμβουλευτείτε την πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Αντενδείξεις, Υπερευαίσθησια. **Τυπότητα χορήγησης:** με μη-ελεγκτικούς μη-αναστρέψιμους αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟΙ). Ημερήσια δόση με αποτέλεσμα ημερήσια βλάβη. Σε συνδυασμό με τη φλοζεταμίνη, τη σερτολεξίνη ή την ενδοξίνη. Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κλάση κρεατινίνης < 30ml/min). Σε ασθενείς με μη ελεγχόμενη υπέρταση. **Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προειδοσίες κατά τη χρήση:** Μανία και επιληπτικές κρίσεις. Μια προοχή σε ασθενείς με ιστορικό μανίας ή με διάγνωση διπολικής διαταραχής και/ή επιληπτικών κρίσεων. **Μυδρίαση:** Προοχή σε ασθενείς με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση ή με κίνδυνο εμφάνισης κρίσης γλαυκώματος κλειστής γωνίας. **Αρτηριακή πίεση και καρδιακές ρυθμίες:** Προοχή σε ασθενείς των οποίων οι καταστάσεις ενδέχεται να επιπλοκούνται από αύξηση του καρδιακού ρυθμού ή της αρτηριακής πίεσης. **Νευρική δυσλειτουργία:** Αυξημένες συγκεντρώσεις της ντολοξετίνης στο πλάσμα έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με σοβαρές μορφές νεφρικής ανεπάρκειας, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (κλάση κρεατινίνης < 30 ml/min). **Σύνδρομο σερτονίνης:** Στη συσχέτιση με άλλους σερτονινεργικούς παράγοντες, με παράγοντες που επδρούν στο μεταβολισμό της σερτονίνης ή άλλους ντοπαμινεργικούς ανταγωνιστές, συστήνεται προσεκτική παρακολούθηση του ασθενή. **Αρτηριακή:** Στιγνή παρακολούθηση των ασθενών θα πρέπει να συνδυάζεται με τη φαρμακολογική αγωγή. **Χορήγηση σε παιδιά και έφηβους ηλικίας κάτω των 18 ετών:** Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη θεραπεία παιδιών και εφήβων κάτω των 18 ετών. **Αμορφία:** Προοχή, σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιψυχωσική αγωγή και/ή φαρμακωτικά προϊόντα με γνωστή επίδραση στην λειτουργία των αμφοταλινών καθώς και σε ασθενείς με γνωστή αμορφία διάθεσης. **Υπερτασμία:** Προοχή σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο υπερτασμίας. **Διακοπή της θεραπείας:** Συνιστάται η σταδιακή μείωση της ντολοξετίνης κατά τη διακοπή της αγωγής για μία χρονική περίοδο τουλάχιστον 2 εβδομάδων. **Ηπατική:** Αναβάλλεται προοχή κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ηπατικών ασθενών όσον αφορά τη μέγιστη δόση. Τα κλινικά δεδομένα σε διακοσμημένους ασθενείς με ΓΑΔ είναι περιορισμένα. **Ακαταξία/γυμναστική αναστολή:** Στους ασθενείς που εμφανίζουν τα συμπτώματα αυτά, η αύξηση της δόσης μπορεί να είναι επιβλαβής. **Ηπατίτιδα/αυξημένα ηπατικά ένζυμα:** Θα πρέπει να χορηγείται με προοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν άλλα φαρμακευτικά προϊόντα που σχετίζονται με ηπατική βλάβη. **Συμπαρξία:** Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας της φρουκτόζης, διασποράφησης της γαλακτόζης-γλυκόζης ή ανεπάρκειας της ισομετάσης της σακχαρώδους, δεν πρέπει να λαμβάνουν CYMBALTA. **Κίνηση και γαλουχία:** Κίνηση: Το Cymbalta πρέπει να χορηγείται σε έγκυες μόνον εάν το αναμενόμενο όφελος (για τη μητέρα) δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Πόλυξες δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. **Επιβλαβείς στην ανάπτυξη οδήγησε και χειρουργική μηχανή:** Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται που νοούνται καταστολή και άλλα θα πρέπει να αποφεύγουν πιθανά επικίνδυνα εργαλεία όπως η οδήγηση ή τον χειρισμό μηχανών. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Πολύ συχνές (≥ 1/10): κεφαλαλγία, υπέρταση, διάρροια, ναυτία, εφροστίαση, ζάχαρες (≥ 1/100 έως < 1/10): Μειωμένη όρεξη, Απένια, διέγερση, Πενήσια ορμή μειωμένη, Άγχος, Μη φυσιολογικός ορσμός, Μη φυσιολογικά όνειρα, Ζάλη, Αιθάργος, Τρόμος, Παράσχηση, Θάμβος όρασης, Είδωμο, Αίσθημα παλμών, Αρτηριακή πίεση αυξημένη, Εξάνθημα, Χαλαρομυρία, Δυσκολία στην διάκριση, Κοιλιακό άλγος/έμετος, Δυσουλολία Μετασχηματισμός, Επιδόρωση αυξημένη, Εξάνθημα, Μυοσκελετικός πόνος, Μυϊκές σπασμοί, Δυσουλολία, Σπαστική δυσλειτουργία, Διαταραχές

εκπεριμάτωση, Καθυστερημένη εκπεριμάτωση, Αδυναμία να σταθεί όρθιος, Κόπωση, Σωματικό βάρος μειωμένο. **Όχι συχνές (≥ 1/1000 έως < 1/100):** Δαρυγλίωση, Υπεργλυκαιμία, Αυτοκτονικός ιδεασμός, Διαταραχή ύπνου, Τροχίλι των οδόντων, Αποπροσανατολισμός, Απάθεια, Μυϊκόλανος, Ακαθψία, Νευροκίττα, Διαταραχή στην προοχή, Δυσουλολία, Δυσουλολία, Σύνδρομο ανήσυχου ποδιού, Κακή ποιότητα ύπνου, Μυδρίαση, Οπτική δυσλειτουργία, Άγχος, Ήταλγία, Τάχυκαρδία, Υπερκοιλιακή αρρυθμία, κοκκία κόπωση μαρμαρυγή, Σπαστική, Υπέρταση, Ορθοστατική υπόταση, Περιφερική γυμναστική, Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του βάρκα και του μεσοθωρακίου: Συσφραγιστικό αίσθημα Λαιμού, Επιστάση, Αμορφία, του γαστρεντερικού συστήματος, Παρνευριτιδα, Ερυθμή, Παρνευριτιδα, Δυσουλολία, Ηπατίτιδα, Αυξημένα ηπατικά ένζυμα, Οξεία ηπατική βλάβη, Νεκροτική δρόση, Κίνδυση, Δερματίτιδα από επαφή, Κρύος ιδρώτας, Αντιδράσεις φωτοευαισθησίας, Αυξημένη τάση εσχμύσεων, Μυϊκό σπλμιο, Μυϊκές δειψιδόσεις, Κατακρήνηση ούρων, Δυσουλολία στην ούρηση, Νυκτοουρία, Πολυουρία, Μειωμένη ροή των ούρων, Γυναικολογική αμορφία, Διαταραχές εμμηνορροής, Σξζουαλική δυσλειτουργία, Άλγος όρχων, Θωρακικό άλγος, Αίσθημα μη-φυσιολογική Αίσθηση ψυχρού, Δίμα, Ρύνη, Αίσθημα καούρας, Αίσθημα θερμιά, Διαταραχές στη βάδιση, Σωματικό βάρος αυξημένο, Κρεατινοσφο-κωνία αιμάτος αυξημένη, Κάλλιο αιμάτος αυξημένο, Σπάνια ανεπιθύμητες ενέργειες (≥ 1/10.000 και < 1/1.000): Αναφυλακτική αντίδραση, Διαταραχή υπερουαισθησίας, Υποθυροειδισμός, Αρρυθμία, Υπερτασμία, ΣΙΔΑΗ, Αυτοκτονική συμπεριφορά, Μανία, Υπερδυσθής, Επιθετικότητα και οργή, Σύνδρομο σερτονίνης, Σπασμοί, Ψυχοκινητική ανησυχία, Εξοπμοραμικό σμμεταμύα, Πλασμοία, Υπερταστική κρίση, Σπασμική, Αμμοτοξία, Δυσουλολία του στόματος, Ηπιακή ανεπάρκεια, Ίκτερος, Σύνδρομο Stevens-Johnson, Αγγειοκυρωτικό σύνδρομο, Τροχίλι, Μη φυσιολογική οσμή ούρων, Σμμεταμύα εμμηνορροής, Αιμακτορία, Υπερπρωλακτινμία, Χοληστερόλι αιμάτος αυξημένη. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Eli Lilly Nederland BV, Grootsteeg 1-5, NL-3991 RA Houten, Ολλανδία. **ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΑΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 30mg: EU/1/04/296/006, 60mg: EU/1/04/296/002. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ:** 17 Δεκεμβρίου 2004. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Οκτώβριος 2013. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Κορηγείται με ιατρική συνταγή. **ΔΙΑΝΙΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ:** Κάψουλες των 30mg σε κοβή των 28, €20,35. Κάψουλες των 60mg σε κοβή των 28, €32,41.



Cymbalta®
duloxetine HCl



ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ - ΛΙΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 150 γλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά **ΤΗΛ:** 210 6294600 **Fax:** 210 6294610, Τ.Θ. 51288
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Αδριανοπούλεως 24, 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη **ΤΗΛ:** 2310 480160
Για παραγγελίες: **ΤΗΛ:** 210 6294629 **Fax:** 210 6294630 **e-mail:** orders@lilly.gr **www.lilly.gr**